

PROMAG

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA
FORMULAZIONE: LIQUIDA
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 28

UFI: S15E-S46P-4SKU-81NG

**Composizione:**

- PROPAMOCARB cloridrato g. 66,7 (= 722 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P261 Evitare di respirare la nebbia/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla legislazione nazionale.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 13005 del 02/03/2006

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL- Rue de Renory, 26/1 – B-4102 OUGRÉE (BELGIO) TEL.+32.4.385.97.11

Officine di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sparl- rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) – Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India)

Stabilimento di confezionamento: CIFO Srl - via Oradour, 6/8 – 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Stabilimenti di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; ARCO Logistica Srl – Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassirya 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)

Distribuito da: Sharda Worldwide Exports pvt. Ltd. Rappresentata da Sharda Europe b.v.b.a. - Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgio) - Tel +32(0)2 466.44.44; CIFO Srl - Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO); Agrisystem srl - Via dei Bizantini 216, 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel.: 0968461121; UPL Italia SRL – Via Terni 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto netto: ml 100 – 500; L 1 – 5 – 10 - 20

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - IN CASO DI INTOSSICAZIONE CHIAMARE IL MEDICO PER I CONSUETI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHEFungicida sistematico per la difesa di numerose colture da malattie causate da Oomiceti quali *Pythium*, *Phytophthora*, *Pseudoperonospora*, *Bremia*.

Il principio attivo è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare ed è caratterizzato da elevata persistenza d'azione e selettività colturale. Il trattamento stimola anche la radicazione e lo sviluppo vegetativo. L'applicazione del formulato può essere effettuata prima o dopo la semina o il trapianto della coltura con diverse modalità: irrorazioni fogliari, applicazioni al terreno, concia dei bulbi, distribuzione nell'acqua di irrigazione, aggiunta ai substrati e ai terricciati.

TRATTAMENTI FOGLIARI

- **Cetriolo (in serra):** 1,5-1,7 l/ha (massimo 1,25 kg di propamocarb/Ha) in 5-15 hl di acqua per ettaro effettuando un massimo di 3 trattamenti (ogni 10 giorni minimo) a stagione.
- **Zucchino (in campo e serra), Melone, Cocomero (in campo):** litri 1,5-3 di formulato per ettaro in 5-15 ettolitri di acqua (3-10 per Melone e Cocomero).
- **Lattuga (in campo):** litri 1,5 di formulato per ettaro in 4-15 ettolitri di acqua.

Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. Effettuare al massimo 3 applicazioni per stagione distanziate di almeno 10 giorni.

TRATTAMENTI AL TERRENO**Peperone, Cetriolo, Zucchino (in serra), Tabacco, Floreali**

- distribuire ml 5-10 per metro quadro di superficie in 3-6 litri di acqua oppure 100 ml di una soluzione allo 0,15% (15 ml di prodotto in 10 litri d'acqua) per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta. Effettuare 1-2 trattamenti distanziati di 7-10 giorni prima o immediatamente dopo il trapianto. Su floreali il trattamento può essere effettuato anche successivamente. Su **Garofano e Gerbera** distribuire ml 10 per metro quadro di superficie in 3-6 litri di acqua due giorni prima dell'impianto e procedendo successivamente all'incorporamento.

DISTRIBUZIONE MEDIANTE IRRIGAZIONE A GOCCIA

- **Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), Cucurbitacee (cetriolo, zucchino, melone, cocomero) in serra:** litri 2 1 di formulato per ettaro in 5-15 ettolitri d'acqua. Effettuare al massimo 4 trattamenti per stagione distanziati di 7-15 giorni.

PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI e dei SUBSTRATI

Vivai e semenzai (in serra) di: **Ortaggi a frutto (pomodoro, melanzana, cetriolo, melone, zucchino, cocomero, zucca), Cavoli (cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, Cavolo cinese), Ortaggi a foglia (lattuga, erbe fresche), Ortaggi a stelo (porro e sedano), Ortaggi a tubero (patata e sedano rapa), Cipolla, Tabacco, Ornamentali e floreali**

- Impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio/substrato, disciolti in circa 10 litri di acqua.

CONCIA DEI BULBI DELLE FLOREALI E DELLE ORNAMENTALI: per controllare *Pythium ultimum* e *Phytophthora* si immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per 100 litri d'acqua. Successivamente, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 ml di prodotto per metro quadrato in 3-6 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.

Forzatura della cicoria witloof.

Trattamento alle radici: distribuire 3 litri di una soluzione allo 0,3% (30 ml di prodotto in 10 litri d'acqua) per metro quadro.

Applicazione in fertirrigazione: ml 12,5 di prodotto per 100 litri di soluzione.

COMPATIBILITÀ: Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli Oli minerali. **Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per **Peperone, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero; 14 giorni per Lattuga, 21 giorni per Cicoria Witloof**

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIANO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

PROMAG

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA

FORMULAZIONE: LIQUIDA

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 28

UFI: S15E-S46P-4SKU-81NG

Composizione:

-PROPAMOCARB cloridrato g. 66,7 (= 722 g/l)

-Coadiuvanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261 - Evitare di respirare la nebbia/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla legislazione nazionale.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 13005 del 02/03/2006

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL- Rue de Renory, 26/1 – B-4102 OUGREE (BELGIO)- TEL.+32.4.385.97.11

Distribuito da: Sharda Worldwide Exports pvt. Ltd. Rappresentata da Sharda Europe b.v.b.a. - Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgio)- Tel +32(0)2 466.44.44; CIFO Srl - Via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO); Agrisystem srl - Via dei Bizantini 216, 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel.: 0968461121; UPL Italia SRL – Via Terni 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto netto: mL 100

Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE