

VIVER® ELITE WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI
AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

VIVER ELITE WG

Registrazione n. 12994 del 28.04.2011 Ministero della Salute

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Tebuconazolo puro 25 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene: dodecil solfato di sodio,
Diisopropilnaftalensolfonato di sodio



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 - Nocivo se ingerito. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P330 - Sciacquare la bocca. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A - 20122 Milano
sede amm.va via Guelfa 5 - 40138 - Bologna.
Tel. 051 0394022

Stabilimento di Produzione:

Hemani Industries Ltd - Ankleshwar - 393002, Gujarat, India

Sulphur Mills Ltd. - Guarat (India)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Chemark Kft. - Peremarton gyártótelep (Ungheria)

Stabilimento di confezionamento:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:

Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG). Tel. 0363 355611

Gowan Italia S.r.l. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Agrisystem S.r.l. - Via dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ). Tel. 0968 461121

Contenuto: 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 kg

Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nei tappeti erbosi trattati, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleini.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO - VIVER ELITE WG è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. VIVER ELITE WG può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Pomacee (Melo, Pero):

- contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*) alla dose di **40-50 g/hl**, senza superare la dose di 0,75 kg/ha, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluamide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare VIVER ELITE WG anche con effetto curativo, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.

- contro Oidio o Mal bianco alla dose di **40-50 g/hl** senza superare la dose di 0,75 kg/ha.

- contro Maculatura bruna del Pero alla dose di **50 g/hl** senza superare la dose di 0,75 kg/ha.

Sono consentite 3 applicazioni l'anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Drupacee (Pescio e Nettare, Albicocco, Ciliegio, Susino):

- contro Monilia (*Monilia*) e Botrite alla dose di **50-75 g/hl**, senza superare la dose di 1,125 kg/ha, intervenendo: a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti; b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni;

- contro Mal bianco alla dose di **50-75 g/hl**, senza superare la dose di 1,125 kg/ha

- contro Ruggine del Susino alla dose di **50 g/hl**, senza superare la dose di 1,125 kg/ha, effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Sono consentite 2 applicazioni l'anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Vite (da vino e da tavola)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/09/2018 con validità dal 01/10/2018 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n.

55/2012, con validità dal 03/11/2021

- contro Oidio alla dose di **40 g/hl**, senza superare la dose di 0,4 kg/ha, ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)

Sono consentite 3 applicazioni l'anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Noce ed altri frutti a guscio:

- contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.), 2 trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di **70 g/hl**, senza superare la dose di 1,05 kg/ha.

Sono consentite 2 applicazioni l'anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchini, Pomodoro, Peperone, Carciofo:

- contro Oidio alla dose di **50 g/hl** trattando ogni 7-10 giorni senza superare la dose di 0,5 kg/ha.

Sono consentite 4 applicazioni l'anno indipendentemente dalla patologia trattata. Su melone, cetriolo, zuccino, pomodoro applicazioni consentite sia in pieno campo che in serra. Su cocomero applicazioni consentite solo in pieno campo.

Aglio: contro Ruggine (*Puccinia allii*) alla dose di 1,0 kg/ha

Frumento, Orzo:

VIVER ELITE WG si impiega alla dose di **1,0 kg/ha** intervenendo: a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata b) contro Oidio o "Mal bianco", Ruggini (*Puccinia*), Rincosporiosi (*Rhynchosporium*), Elmintosporiosi, Septoria (*Septoria*) dalla fase di inizio levata alla spigatura; c) contro le Fusariosi della spiga (*Fusarium*) in fase di piena fioritura

E' consentita una sola applicazione l'anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Tappeti erbosi:

- contro *Microdochium nivale*, *Sclerotinia homeocarpa*, *Rhizoctonia solani* e 1,5-2,0 g per 10 m² (1,5-2,0 kg/ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	750	3	1400-1500
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50	750	3	1400-1500
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1125	2	1000-1500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1125	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1125	2	1200-1500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1125 750	2	1000-1500
Noce e frutta a guscio	Antracnosi, Necrosi della gemma apicale	70	840-1050	2	1200-1500
Vite	Oidio	40	400	3	1000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchini, Pomodoro, Peperone, Carciofo	Oidio	50	500	4	800-1000
Aglio	Ruggine		1000	2	800-1000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		1000	1	400-600
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>		1500-2000	2	600-800

COMPATIBILITA' – VIVER ELITE WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni per Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchini, 7 giorni prima del raccolto per Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino, Melone, Zucca, Cocomero, Carciofo; 14 per la Vite, Pero e Melo; 21 per Aglio; 30 per Frumento e Orzo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato Gowan