

PIRECRIS

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRINE - CONCENTRATO EMULSIONABILE
Meccanismo d'azione IRAC 3A

PIRECRIS - Registrazione del Ministero della Salute n. del	
Composizione	
PIRETRINE pure (da estratto di piretro 480 g/Kg)	g. 2,14 (=20 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

ATTENZIONE



SEIPASA, S.A.
C/Almudévar, 2 - 22240 Tardienta (Huesca) - Spagna
Tel. +34 962 541 163

Stabilimento di produzione:

SEIPASA, S.A.
C/ Ciudad Dario, naves 1-3-5, 46250 L'Alcudia, Valencia (Spagna)

Contenuto netto: 0,120-0,250-0,500-1-5-10-20 Litri

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosoli.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e proteggere gli occhi.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ventilare le serre trattate fino a che la vegetazione non sia completamente asciutta prima di rientrarvi. Usare guanti durante la manipolazione del prodotto. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti misure di mitigazione da corpi idrici superficiali:

- una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri per pomodoro, melanzana, peperone, lattuga e insalate (foglie di spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, incluse baby leaf). Utilizzare ugelli atti a ridurre la deriva.
- una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri in associazione a dispositivi che riducano la deriva del 90% per vite.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 3 m in associazione a dispositivi che riducano la deriva del 50% per vite.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre - post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipotermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE

PIRECRIS è un insetticida ad ampio spettro a base di Piretro naturale per il controllo di insetti su diverse colture, tanto in pieno campo come in serra. La sua formulazione liquida è al 100% di origine vegetale. Possiede azione per contatto e per ingestione. La sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza. PIRECRIS può essere utilizzato in lotta biologica e il lancio degli insetti utili va realizzato subito dopo che la vegetazione trattata si è asciugata.

Il prodotto è indicato per programmi di lotta integrata e coltivazione biologica e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

I trattamenti devono essere eseguiti in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per garantire una buona copertura delle colture, con particolare attenzione alla parte inferiore delle foglie.

DOSI D'IMPIEGO

Il PIRECRIS si impiega sulle seguenti colture:

POMODORO e MELANZANA (in campo e serra) contro Mosca bianca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di 150-225 ml/ha (dose min. 0,9 L/ha, max. 1,5 L/ha), distribuita con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni.

PEPERONE (in campo e serra) contro Afidi (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*): intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di 120-180 ml/ha (dose min. 0,7 L/ha, max. 1,2 L/ha), distribuita con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni.

LATTUGHE e INSALATE: FOGLIE DI SPINACI e SIMILI; ERBE FRESCHE e FIORI COMMESTIBILI (inclusa BABY LEAF) (in campo) contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri*, *Myzus persicae*, *Hyperomyzus lactucae*): intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose di 150-200 ml/ha (dose min. 0,7 L/ha, max. 1,5 L/ha), distribuita con volumi d'acqua di 300-750 L/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni.

VITE (in campo) contro le cicaline (Cicadellidae - *Empoasca vitis*, *Scaphoideus titanus*, *Jacobia scia lybica*): intervenire all'inizio dell'infestazione alla dose compresa tra 0,7 L/ha (min) e 1,5 L/ha (max), distribuita con volumi d'acqua di 200-800 L/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni.

Per applicazione fogliare, regolare l'acqua del serbatoio ad un pH 6-5-7.

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti fortemente acidi o basi.

AVVERTENZA: in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di latenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione composta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta in pomodoro, melanzana, peperone, lattuga e spinacio. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima sulla vite.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 DIC 2010

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE IL PRODOTTO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE.
EVITARE TEMPERATURE SUPERIORI A 50°C**

NON APPLICARE CON MEZZI AERI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **17 DIC 2019**