

**agrisystem**

sistemi ecocompatibili per l'agricoltura

la protezione più completa  
contro la peronospora

**MIDAURIL<sup>®</sup> R FLOW**

FUNGICIDA AD AZIONE  
PREVENTIVA E CURATIVA  
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA



[www.agrisystem.com](http://www.agrisystem.com)

# MIDAURIL® R FLOW

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA  
E CURATIVA  
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA  
CODICE FRAC: RAME M1;  
METALAXYL-M4



## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

## CONFEZIONI

Flaconi da 1 L  
(confezioni da 10 pz)  
Taniche da 10 L

## REGISTRAZIONE

N. 11709 del 08/10/2020

## CLASSIFICAZIONE CLP

 ATTENZIONE

## COMPOSIZIONE

Rame metallo ..... g 15,4 (=200 g/L)  
(sotto forma di Solfato Tribasico)  
Metalaxil-M puro ..... g 1,85 (=24 g/L)  
Coformulanti\* q. b. a. .... g 100  
\*Contiene 2,2',2''-  
(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo

SCANSIONA PER  
SAPERNE DI PIÙ



skeda.com 01/2025

# agrisystem

sistemi ecocompatibili per l'agricoltura

Via dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel. 0968.461121 - Fax 0968.464455

## Ufficio Tecnico

Cell. 348.2493210 - tecnico@agrisystem.com

## Ufficio Commerciale

Cell. 348.2493211 - commerciale@agrisystem.com

MIDAURIL® R FLOW è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-M, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

## DOSI E MODALITÀ D'USO

### Vite

28 giorni di carenza

Peronospora (*Plasmopora viticola*)

Dose: 400 ml/ha (4 L/ha)

Intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti).

**Pomodoro** (pieno campo e serra)

10 giorni di carenza

Peronospora (*Phytophthora infestans*),

Alternaria (*Alternaria porri* sp. *solani*)

Dose: 4 L/ha

3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni.

### Patata

20 giorni di carenza

Peronospora (*Phytophthora infestans*),

Alternaria (*Alternaria porri* sp. *solani*)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Fragola** (pieno campo e serra)

40 giorni di carenza

Marciume bruno (*Phytophthora cactorum*)

Dose: 4 L/ha

15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.

**Carciofo** (pieno campo)

20 giorni di carenza

Peronospora (*Bremia lactucae*),

Alternaria (*Alternaria* spp.)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Cocomero** (pieno campo)

7 giorni di carenza

Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*),

Alternaria (*Alternaria* spp.)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Melone** (pieno campo e serra)

15 giorni di carenza

Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*),

Alternaria (*Alternaria* spp.)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Cetriolo** (pieno campo e serra)

15 giorni di carenza

Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*),

Alternaria (*Alternaria* spp.)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Lattughe e insalate** (pieno campo e serra)

15 giorni di carenza

Peronospora (*Bremia lactucae*)

Dose: 4 L/ha

2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

*Modalità d'impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 gg dall'ultimo trattamento con MIDAURIL® R FLOW. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all'anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all'anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all'anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 L/ha di formulato.*



Senza Midauril R Flow



Con Midauril R Flow



Senza Midauril R Flow



Con Midauril R Flow