



# RETICLAIR™

INSETTICIDA  
A BASE DI SPINOSAD

**biologico,  
concentrato,  
efficace**



# RETICLAIR™

INSETTICIDA A BASE DI SPINOSAD  
SOSPENSIONE CONCENTRATA  
CODICE IRAC: 5

Insetticida a base di spinosad, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su tripidi, Liriomyza, tignole della vite, Carpocapsa, tortricide ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.



## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

## CONFEZIONI

Flacone da 0,25 L (confezioni da 20 pz)

Flacone da 0,5 L (confezioni da 20 pz)

## REGISTRAZIONE

N. 18669 del 20/05/2024

## CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

## COMPOSIZIONE

Spinosad puro ..... g 44,2 (= 480 g/L)

Coformulanti q. b. a ..... g 100

Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

SCANSIONA PER  
SAPERNE DI PIÙ



skeda.com 02/2025

# agrisystem

sistemi ecocompatibili per l'agricoltura

Via dei Bizantini, 216 - 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel. 0968.461121 - Fax 0968.464455

## Ufficio Tecnico

Cell. 348.2493210 - tecnico@agrisystem.com

## Ufficio Commerciale

Cell. 348.2493211 - commerciale@agrisystem.com

## IMPIEGABILE SU:

### Vite da vino e vite da tavola (pieno campo)

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*), Tignola della vite (*Clysia ambiguella*), Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tripide della vite (*Drepanothrips reuteri*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Oziorrinco (*Otiorrhynchus* spp.)

### Melo, Pero, Melo cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi (pieno campo)

Carpocapsa (*Cydia pomonella*), Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*), Tortrice verde, Tortrice verde-gialla (*Pandemis* spp.), Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*), Caceia (*Archips* spp.), Capua (*Adoxophyes* spp.), Cemiostoma (*Leucoptera scitella*), Litocollete (*Phyllonoricter* spp.), Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*)

### Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno (pieno campo)

Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

### Pistacchio (pieno campo)

Tignola delle foglie (*Teleiodes decorella*)

### Fragola (pieno campo e serra)

Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*)

### Mora, Lampone, Mirtillo, Ribes, Uva spina (pieno campo e serra)

Cecidomia della corteccia dei lamponi (*Resseliella theobaldi*), Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (*Sinanthedon tipuliformis*), Tentredine (*Peteronidea ribesii*), Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), Tortrice dei germogli (*Notocelia udmanniana*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*)

### Pesce, Nectarina, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena (pieno campo)

Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Cydia del susino (*Cydia funebrana*), Tripide migrante (*Thrips meridionalis*), Tripide non migrante (*Thrips major*) del pesco, Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*)

### Pomodoro, Melanzana (pieno campo e serra)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Fillominatrice del pomodoro (*Tuta absoluta*)

### Peperone (pieno campo e serra)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Fillominatrice del pomodoro (*Tuta absoluta*)

### Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchini, Anguria (pieno campo e serra)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Minatrice americana della gerbera (*Liriomyza trifolii*) in serra, Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*)

### Spinacio, Bieta da foglie e da coste (pieno campo);

### Baby-leaf (pieno campo e serra)

Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide delle palme (*Thrips palmi*)

### Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Taccola (pisello mangiatutto) (pieno campo)

Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), Nottua del cavolo (*Mamestra brassicae*)

### Patata (pieno campo)

Dorifora della patata (*Leptinotarsa decemlineata*), Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*)

### Lattughe (pieno campo)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*)

**Baby-leaf ed erbe fresche (Valerianella, Crescione, Rosmarino, Basilico, Erba cipollina, Maggiorana, Melissa, Menta, Origano, Salvia, Timo, Santoreggia, Ruta, Pimpinella, Ortica, Issopo, Dragoncello, Cerfoglio, Acetosa, Nasturzio)** (pieno campo)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Minatrice americana della gerbera (*Liriomyza trifolii*)

### Prezzemolo (pieno campo)

Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Minatrice americana della gerbera (*Liriomyza trifolii*)

### Rucola (serra)

Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), Nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*), Minatrice americana della gerbera (*Liriomyza trifolii*)

### Cipolla (in pieno campo), Aglio e Scalogno (in pieno campo e serra)

Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Nottua (*Agrotis* spp.), Cosside dell'aglio (*Dispeza ulula*), Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Nottua (*Agrotis* spp.), Cosside dell'aglio (*Dispeza ulula*)

### Porro, Carciofo, Finocchio, Sedano (pieno campo)

Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tripidi del pisello (*Thrips angusticeps*), Nottua del carciofo (*Gortyna xanthenes*), Nottua mediterranea (*Spodoptera* spp.), Nottua in generale (*Agrotis* spp.), Depressaria dei capolini del carciofo (*Depressaria erinaceella*), Mosca del porro (*Napomyza gymnostoma*)

### Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza: Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza (pieno campo e serra)

Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Nottue dei cavoli (*Mamestra* spp.), Cavolaia (*Pieris* spp.), Rapaiola (*Pieris rapae*), Nottua mediterranea (*Spodoptera* spp.), Tignola delle crucifere (*Plutella xylostella*), Nottua in generale (*Agrotis* spp.)

### Colture floreali (Rosa, Crisantemo, Garofano, Gerbera) (pieno campo e serra)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide delle palme (*Thrips palmi*), Mosca minatrice americana (*Liriomyza trifolii*) e sud-americana (*Liriomyza huidobrensis*) in serra, Bega mediterranea del garofano (*Cacoecia pronubana*), Nottua mediterranea (*Spodoptera* spp.)

### Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite non ancora in produzione)

Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), Tripide delle palme (*Thrips palmi*), Mosca minatrice americana (*Liriomyza trifolii*) e sud-americana (*Liriomyza huidobrensis*) in serra, Processionaria delle querce (*Thaumetopoea processionea*), Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), Bombice dispari (*Lymantria dispar*), Ifantria (*Hyphantria cunea*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*)

### Specie arboree ornamentali

Processionaria delle querce (*Thaumetopoea processionea*), Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), Bombice dispari (*Lymantria dispar*), Ifantria (*Hyphantria cunea*), Cemiostoma (*Leucoptera scitella*), Litocollete (*Phyllonoricter* spp.), Cameraria (*Cameraria ohridella*), Galerucella dell'olmo (*Galerucella luteola*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*)

### Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo

Nottua dei seminati (*Agrotis ipsilon*), Nottua mediterranea (*Spodoptera* spp.)

Per le dosi e le modalità d'uso consultare il catalogo o l'etichetta ministeriale

