

PALIO™

Erbicida sistemico selettivo per frumento tenero e duro,
efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

Composizione di PALIO

Pyroxsulam puro	g 75
Cloquintocet mexyl (antidoto agronomico)	g 75
Coformulanti	q.b. a g 1000



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene Pyroxsulam e Cloquintocet-methyl. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P405+P102: - Conservare sotto chiave. P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente. P301+P313+P331: IN CASO DI INGESTIONE: consultare un medico. P331: NON provocare il vomito. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P302+P352+P361 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P361: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P304+P340+P313: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico.

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona

Tel. +39 0372 709900

Distribuito da:

Sipcam Italia S.p.A. - Via Sempione 195, 20016 Pero (MI) – Tel 02 353 78400

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Mozzanica (BG) - Italia

Corteva Agriscience LLC – Midland, Michigan (USA)

Corteva Agriscience France S.A.S – Cernay - Francia

Schirm GmbH – Lubeck (DE)

Torre S.r.l. – Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI) – Italia

Sinteco logistics S.p.A.– S.Giuliano Milanese (MI) - Italia

(solo ri-etichettatura)

Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 10 kg

Registrazione n. 17455 del 12/09/2019 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono del 75% la deriva.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consigli generali: Non somministrare fluidi né indurre vomito se il paziente è incosciente o ha convulsioni. La decisione di indurre il vomito dev'essere presa dal medico. **In caso di ingestione:** Consultare un medico. NON indurre il vomito. **In caso di contatto con gli occhi:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle, qualora possibile. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: Consultare un medico (oftalmologo). **In caso di contatto con la pelle:** Lavare con abbondante acqua e sapone. Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. **In caso di inalazione:** Portare la vittima all'aria aperta e posizionarla in modo da facilitare la respirazione. Consultare un medico.

Non esiste un antidoto specifico. Seguire il trattamento sintomatico.
Consultare un Centro Antiveneno.

MODALITÀ D'AZIONE

PALIO è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza, a base di pyroxsulam. Pyroxsulam è una sulfonamide del gruppo delle triazolopirimidine (gruppo "B" secondo la classificazione HRAC) che agisce come inibitore dell'enzima acetolattato sintasi (ALS), un enzima chiave nella biosintesi di aminoacidi a catena ramificata (leucina, valina, isoleucina).

La crescita delle infestanti suscettibili rallenta alcune ore dopo l'applicazione del preparato, nonostante che sia possibile non osservare per alcuni giorni alcun effetto visibile. Alcuni sintomi come la clorosi o la necrosi si manifestano in primo luogo nella parte superiore del meristema della pianta. Anche le foglie nuove nella parte superiore appassiscono. In seguito l'effetto si estende alle altre parti della pianta. La morte completa delle infestanti si rileva nell'arco di 2-3 settimane dal trattamento. L'attività ottimale si raggiunge nelle infestanti nella fase iniziale di rapido accrescimento.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PALIO è selettivo per i seguenti cereali vernici: **frumento tenero e frumento duro**, fino ad primo nodo della coltura. PALIO può essere usato su queste colture per le produzioni di semi.

INFESTANTI CONTROLLATE

Per aumentare l'efficacia del trattamento ed il controllo delle specie infestanti suscettibili è possibile impiegare un bagnante specifico per erbicidi attenendosi alla dose di etichetta per controllare le principali infestanti graminacee dei cereali secondo le seguenti classificazioni:

Infestanti sensibili: coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), avena selvatica (*Avena spp.*), forasacco (*Bromus mollis*), loglio (*Lolium spp.*).

Infestanti mediamente sensibili: scagliola (*Phalaris spp.*).

DOSE D'IMPIEGO: 0,250 kg/ha.

EPOCA D'IMPIEGO

L'epoca ottimale di applicazione di PALIO è durante l'accostamento della coltura dallo stadio di inizio accostamento al primo nodo del cereale. Il controllo ottimale delle infestanti graminacee si raggiunge nella fase fenologica di 3-5 foglie vere.

Note: Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale. Il prodotto è fitotossico su orzo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il trattamento è da eseguire utilizzando 200 – 300 litri d'acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti.

Versare gradualmente PALIO, in un piccolo recipiente contenente acqua diluendo poi questa miscela, nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, con l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed aggiungere l'eventuale bagnante alla fine, con l'agitatore in movimento. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa.

Note: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con PALIO, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione. Si raccomanda un intervallo minimo di 4 mesi dopo l'applicazione di PALIO per colture sensibili quali leguminose.

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA

In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, girasole, soia e graminacee dopo 45 giorni dall'applicazione, avendo cura di effettuare un'aratura prima della semina.

COMPATIBILITÀ

PALIO è miscibile con erbicidi contro infestanti a foglia larga al fine di ampliare il suo spettro di azione.

Per evitare danni alla coltura, non utilizzare PALIO in miscela con:

- Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
- Insetticidi fosforanici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

(PALIO - continua su pag. 2)

FITOTOXICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con le colture agricole, orticole, vivai e giardini, anche sotto forma di deriva portata dal vento.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **60 giorni** prima della raccolta.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.

A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile utilizzare un programma di diserbo con diversi meccanismi d'azione e di utilizzare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole ed in attiva crescita, evitando le condizioni sfavorevoli (freddo, siccità, ristagno, ecc.). PALIO non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad altri erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. E' possibile miscelare PALIO con altri prodotti con meccanismo d'azione ALS per allargare lo spettro d'azione. In presenza di infestanti a ridotta sensibilità raccomandiamo di miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039 0372 709900/709999
(O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024