



## CLASSIFICAZIONE CLP





## FORMULAZIONE

Liquido

## CONFEZIONI

Flaconi da 1 L  
(cartoni da 12 pz)  
Taniche da 5 L  
(cartoni da 4 pz)

-  **CORREGGE LE CARENZE DI ZINCO**
-  **ASSICURA UN'ADEGUATA CRESCITA DELLE PIANTE**
-  **AZIONE SECONDARIA REPELLENTE CONTRO INSETTI E ACARI**

SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI ZINCO (Zn) SOLFATO  
RACCOMANDATO NEGLI STATI DI CARENZA

## COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua .....3,0% P/P

## AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso.

Utilizzare solo in caso di necessità riconosciuta. Non superare le dosi raccomandate. Conservare il prodotto nel suo contenitore originale, chiuso ermeticamente. Conservare tra 5 e 50 °C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali fortemente acidi o alcalini.

## CARATTERISTICHE

ABENTA™ è un prodotto che fornisce zinco alle colture. È raccomandato negli stati di carenza di questo importante micronutriente ed è progettato per assicurare un'adeguata crescita delle piante.

ABENTA™, oltre a rappresentare un'importante fonte di zinco, ha un'azione repellente nei confronti di insetti e acari.

## DOSI E MODALITÀ D'USO

### Orticole in serra

200-300 ml/hl *applicazione fogliare*

Da 4 a 5 applicazioni una volta ogni 8-10 giorni

1,5-3 L/ha *applicazione radicale*

Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni

nelle fasi iniziali di coltivazione

### Orticole in pieno campo

250-300 ml/hl *applicazione fogliare*

Da 4 a 5 applicazioni una volta ogni 8-10 giorni

2-4 L/ha *applicazione radicale*

Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni

nelle fasi iniziali di coltivazione

### Frutticole e Agrumi

200-300 ml/hl *applicazione fogliare*

Da 2 a 3 applicazioni ogni 10-15 giorni

1-3 L/ha *applicazione radicale*

Nei momenti di sensibilità, da 2 a 3 applicazioni

ogni 10-15 giorni

### Altre colture estensive

200-300 ml/hl *applicazione fogliare*

Da 2 a 4 applicazioni ogni 6-10 giorni

1-3 L/ha *applicazione radicale*

Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni

nelle fasi iniziali di coltivazione

