

AMINOSOIL PLUS

IDROLIZZATO
PROTEICO



FORMULAZIONE
Liquido

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg



- MIGLIORA L'ARCHITETTURA RADICALE
- COMBATTE LA STANCHEZZA DEL TERRENO
- INDICATO PER PREVENIRE DANNI DA GELATE E DA STRESS

IDROLIZZATO PROTEICO CONSIGLIATO
PER APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 6,5%
Azoto (N) organico solubile in acqua 6,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica..... 23%

MATERIE PRIME

Carniccio

AVVERTENZE


Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.
Il prodotto, non essendo pericoloso, non necessita di particolari precauzioni durante la manipolazione.

CARATTERISTICHE

Oltre all'apporto di azoto organico, incrementa i livelli di prolina, potente antistress endogeno. Particolarmente indicato per prevenire gelate tardive o periodi climatici avversi. AMINOSOIL PLUS, applicato in fertirrigazione, oltre ad essere assorbito direttamente, velocemente ed efficacemente dalle radici, consente di influire sul contenuto di sostanza organica presente e quindi di migliorare la fertilità globale del terreno. AMINOSOIL PLUS applicato in fertirrigazione migliora pertanto:

- l'efficienza di assorbimento dei nutrienti forniti con la concimazione attraverso la stimolazione dell'attività microbica;
- l'attività di diversi enzimi del suolo;
- la produzione di ormoni e/o di regolatori di crescita delle piante.

APPLICAZIONE SU ORTICOLE, FLORICOLE E FRAGOLE



L'elevato contenuto aminoacidico di AMINOSOIL PLUS, con esclusivi rapporti fra prolina, idrossiprolina e glicina, è fondamentale per risolvere i principali stress e per l'attività chelante.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Orticole, Floricole, Fragole

3-5 kg/1000 m² *applicazione radicale*

I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di sviluppo delle colture.

Frutticole

15-20 kg/ha *applicazione radicale*

I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di sviluppo delle colture.

g/100g

