

BIOCLEAN SB



FORMULAZIONE
Concentrato solubile

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartoni da 15 pz)



SPECIALI
SOSTANZA DI BASE

- RIDUCE LA PROLIFERAZIONE DELLA MALATTIA
- DANNEGGIA IFE E CONIDI DELL'OIDIO
- EFFETTO PREVENTIVO E CURATIVO

SOSTANZA DI BASE UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA CON AZIONE FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Siero di latte
Livello di purezza: CODEX STAN 289-1995
Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n° 2016/560 della commissione del 11 aprile 2016.

AVVERTENZE

Prodotto da nebulizzare sul fogliame, distribuirlo in presenza di sole, preferibilmente al mattino. Non conservare in contenitori di metallo. Per garantire le massime prestazioni si consiglia di tamponare il pH della soluzione tra 5,5-6. Non miscelare BIOCLEAN SB con prodotti a base di rame, oli o miscele solfo-calcio. Se impiegato congiuntamente a prodotti a reazione alcalina può ridurre significativamente la sua efficacia. Se si desidera abbinare ad altri trattamenti (fitosanitari, tensioattivi, fertilizzanti, ecc.) è assolutamente consigliato eseguire un test di compatibilità e di fitotossicità su una piccola porzione. A causa della scarsa adesività del siero di latte sulle foglie si consiglia di aggiungere un prodotto tensioattivo o adesivante, così da migliorare l'efficacia del trattamento (QUICK-WET).

CARATTERISTICHE

Il siero di latte è incluso nella categoria delle sostanze di base. Numerose ricerche mostrano la sua efficacia per il controllo dell'oidio: diversi componenti del latte producono radicali dell'ossigeno che contribuiscono a ridurre l'impatto della malattia sulle foglie trattate. Il siero di latte danneggia le ife e i conidi dell'oidio nelle prime 24 ore dal trattamento.

BIOSOLUTION



EFFETTO PREVENTIVO

- ➔ L'APPLICAZIONE FOGLIARE LIMITA LA PROLIFERAZIONE DELLE MALATTIE
- ➔ INIBISCE LA GERMINAZIONE DELLE SPORE PER LA PRESENZA DELLA "LATTOFERRINA"
- ➔ INNESCA RISPOSTE DIFENSIVE FISIOLOGICHE

EFFETTO CURATIVO

- ➔ AZIONE PER CONTATTO
- ➔ INTERROMPE LA SPORULAZIONE DELLE IFE

DOSI E MODALITÀ D'USO

Cetriolo, Zucchini

300 ml/hl *applicazione fogliare*

Trattamenti: da 3 a 5 ogni 7 giorni

Dalla 9ª foglia alla comparsa delle prime infiorescenze

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta

