CONTEL

ERBICIDA

Prodotto originale
Corteva

FORMULAZIONE
Suspo-emulsione

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 10 pz)

REGISTRAZIONE
N. 17341 del 01/09/2020

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO ED ORZO EFFICACE CONTRO INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

Florasulam puro ..... g 0,58 (=6,25 g/L)
2,4 D ..... 42,32% (=300 g/L)
Coformulanti q.b. a ..... g 100
Contiene: Fatty alcohol ethoxylate
1,2-Benzisothiazolin-3-one

AVVERTENZE
CONTEL è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
III prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare frumento ed orzo, avena, segale e mais senza attendere nessun intervallo.

CARATTERISTICHE

CONTEL è un erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni a base di Florasulam e 2,4 D, due principi attivi dal diverso meccanismo d'azione efficaci nel controllo delle erbe infestanti dicotiledoni di frumento ed orzo.
Il Florasulam appartiene alla famiglia della triazolopirimidine ed agisce inibendo l'enzima acetolattato sintetasi (ALS) mentre il 2,4 D appartiene alla famiglia degli acidi carbossilici ed esplica la sua azione erbicida provocando disturbi nella differenziazione e sviluppo cellulare.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il momento ottimale di applicazione avviene quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e secondo nodo con le infestanti quali papavero, crocifere, ecc. ad uno stadio compreso tra le 6-10 foglie e quando *Galium aparine* non ha superato lo stadio di 15 cm di altezza. Si consiglia di effettuare il trattamento con temperature superiori agli 8-10 °C.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Frumento, Orzo
Dosi: 0,75 L/ha
Volume d'acqua: 200-400 L/ha
avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

INFESTANTI SENSIBILI:
Galium aparine (Attaccamani),
Papaver rhoeas (Papavero),
Matricaria chamomilla (Camomilla comune),
Anthemis arvensis (Camomilla bastarda),
Stellaria media (Centocchi),
Capsella bursa-pastoris (Borsapastore comune),
Diplotaxis erucoides (Ruchetta violacea),
Sinapis arvensis (Senape selvatica),
Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico),
Bifora radians (Coriandolo puzzolente),
Vicia sativa (Veccia dolce),
Thlaspi arvense (Erba storna comune),
Convolvulus arvensis (Vilucchio comune),
Scandix pectenveneris (Acicula comune).

Intervallo di sicurezza: non richiesto