FOLISTYM LS 20

IDROLIZZATO PROTEICO

FORMULAZIONE
Fluido

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartone da 4 pz)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- **ADATTO A TUTTI I TIPI DI COLTURE**
- **APPLICAZIONE SIA FOGLIARE CHE IN FERTIRRIGAZIONE**
- **IN PERIODI DI STRESS ABIOTICO E BIOTICO SBLOCCA TUTTI I MECCANISMI DI PROTEZIONE DELLA PIANTA A LIVELLO GENETICO E RIPRISTINA LA CRESCITA VEGETATIVA**

BIOSOLUTION

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA (BIOSTIMOLANTE)
EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	8,0% p/p
Azoto (N) organico solubile in acqua	8,0% p/p
Carbonio (C) organico	26,6%p/p
Rapporto C/N:	3,3 p/p
Peso molecolare medio (Dalton):	1.000-2.000 p/p
Rapporto Glicina/(Prolina+Idrossiprolina):	1,1 p/p
Grado di idrolisi sul secco:	330 p/p
Amminoacidi liberi (%):	20,0 p/p

MATERIE PRIME: Pellami (Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = Non rilevabile).

AVVERTENZE
Il prodotto, non essendo pericoloso, non necessità di particolari precauzioni durante al manipolazione. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. In caso di lungo stoccaggio agitare periodicamente.
Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento indicate.
FOLISTYM LS 20 non deve essere miscelato, né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni c o n prodotti a forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl aluminum, polisolfuri, triforine composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi.

CARATTERISTICHE

L'uso di FOLISTYM LS 20 è consigliato nei periodi più importanti dello sviluppo (trapianto, fioritura, allegazione, ingrossamento frutti) quando maggiori sono le necessità di tipo fisiologico. Gli effetti positivi si traducono in maggiore resa, aumento dell'allegagione e riduzione degli effetti di cascola, precocità di maturazione ed accorciamento dei cicli produttivi.

L'uso di FOLISTYM LS 20 consente di ottenere un uniforme sviluppo vegetativo e un miglioramento quali-quantitativo dei prodotti agricoli e della loro conservabilità. Distribuito invece nei momenti di stress abiotici (gelate, grandinate, diserbi, eccessi o carenze idriche) e biotici (attacchi fungini, batterici, virali e di insetti) consente un rapido superamento dell'arresto della crescita vegetativa.

DOSI E MODALITÀ D'USO

1. Trattamenti fogliari:
- Colture arboree pre-fioritura, allegagione, ingrossamento, invaiatura: 200-250 g/hl
- Colture industriali in abbinamento con i diserbanti in post-emergenza: 200-300 g/hl
- Orticole in serra ogni 10-15 giorni durante li periodo vegetativo: 200-300 g/hl
- Orticole in pieno campo ogni 10-15 gg durante il periodo vegetativo: 300-400 g/hl

2. Trattamenti in fertirrigazione:
- Colture arboree pre-fioritura, allegagione, ingrossamento, invaiatura: 3,0-6,5 kg/ha
- Orticole in serra ogni 10-15 giorni durante li periodo vegetativo: 6,5-9,0 kg/ha
- Orticole in pieno campo ogni 10-15 gg durante il periodo vegetativo: 4,5-5,5 kg/ha

3. Trattamenti speciali:
A seguito di stress biotici/abiotici (gelate, grandinate ecc) intervenire, al dosaggio più alto, entro 24-48 ore dall'evento trattando una o più volte a distanza di 8-10 giorni.

Nel caso di distribuzione fogliare il prodotto viene rapidamente e completamente assimilato attraverso la cuticola; gli amminoacidi e gli oligopeptidi una volta penetrati all'interno delle foglie sono poi velocemente traslocati agli organi metabolicamente più attivi delle piante dove vengono utilizzati per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri ecc.