MICROSYSTEM Boro L.

LINEA Carbox

FORMULAZIONE
Liquido

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartoni da 20 pz)
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

bio CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- **AUMENTA LA FERTILITÀ DEL POLLINE DELLE COLTURE ORTIVE E DELLA FRAGOLA**
- **INCREMENTA L'ALLEGAGIONE NELL'OLIVO E PREVIENE L'ACINELLATURA NELLA VITE**
- **RIDUCE L'INCIDENZA DELLA SPACCATURA DELLE COSTE DEL SEDANO**

BORO TOTALMENTE COMPLESSATO CON ETANOLAMMINA

BIOSOLUTION

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 11%
Interamente complessato con etanolammina

AVVERTENZE

Il prodotto risulta stabile e compatibile in miscela con la maggior parte dei fertilizzanti ed agrofarmaci in commercio, ad esclusione di solfato di manganese, solfato di zinco ed i prodotti a reazione alcalina. Si consiglia comunque di verificare la compatibilità procedendo a dei saggi preliminari. NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Frutticole
100-300 g/hl *applicazione fogliare*
4-6 kg/ha *applicazione fertirrigazione*
2-3 applicazioni | In pre-fioritura

Vite, Olivo
150-250 g/hl *applicazione fogliare*
5-8 kg/ha *applicazione fertirrigazione*
1-2 applicazioni | In pre-allegagione

Fragola
100-250 g/hl *applicazione fogliare*
2-4 kg/ha *applicazione fertirrigazione*
1-2 applicazioni | A inizio fioritura

Floreali, Ornamentali
250-300 g/hl *applicazione fogliare*
3-5 kg/ha *applicazione fertirrigazione*
1-2 applicazioni | Alla ripresa vegetativa

Barbabietola, Girasole
250-500 g/hl *applicazione fogliare*
8-10 kg/ha *applicazione fertirrigazione*
1-2 applicazioni | Dalla 3° foglia

CARATTERISTICHE

MICROSYSTEM Boro L. è un formulato liquido a base di boro interamente complessato con etanolammina (150 g/l) rapidamente assimilabile sia dalle foglie che dalle radici delle piante (pH in soluzione al 1%: 7,7). Il boro è un microelemento importante per molti processi biochimici di sintesi, quali l'accumulo ed il trasporto degli zuccheri, la fissazione dell'azoto atmosferico la riproduzione cellulare, ecc.
La boro-carenza è una fisiopatia che causa scarsa allegagione e ridotta o mancata produzione.

APPLICAZIONE SU COLZA

EPOCA INTERVENTO	5 kg/ha

Per la colza la concimazione con boro è molto importante. I sintomi di una carenza di boro non sono tanto visibili, nondimeno funesti per la fruttificazione e la produzione dei semi. Richiede fare molta attenzione alle macchie scure e necrotiche sullo stelo, alle deformazioni delle foglie giovani, e alle fessure sui piccioli. Le piante rimangono più piccole e i boccioli potrebbero morire.

APPLICAZIONE SU OLIVO

EPOCA INTERVENTO	150-200 g/hl

La carenza di boro può essere causa di fisiopatie quali, ad esempio, la leptonecrosi. Il boro agisce sulla fecondazione e la conseguente allegagione, pertanto nei casi di carenza si possono avere delle incidenze negative sulla produzione.

APPLICAZIONE SU GIRASOLE



EPOCA INTERVENTO	0,5-0,8 kg/ha

La carenza di boro si manifesta dallo stadio di 8-10 foglie sino alla comparsa del bottone fiorale con chiari sintomi sulle foglie stesse. È in questo stadio infatti che la pianta assorbe circa il 70-80% del fabbisogno totale. Sulle foglie macchie estese simili a bruciature sono tipici sintomi di carenza iniziale; nei casi più gravi si notano successivamente fessure trasversali sullo stelo che possono condurre alla caduta della calatide oppure, successivamente, alla produzione di acheni vuoti in calatidi mal fecondati. Anche talune malformazioni dell'infiorescenza possono essere imputate a carenze precoci di boro.