



FORMULAZIONE
Liquido

CONFEZIONI
Tanche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)

- STIMOLA UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ DI FIORITURA**
- MIGLIORA L'ALLEGAGIONE**
- INCREMENTA LA FRUTTIFICAZIONE**

MIGLIORA LA FERTILITÀ E LA QUANTITÀ DEI FIORI
RIDUCENDONE LA CASCOLA

COMPOSIZIONE



Acidi Organici a basso peso molecolare	
Azoto (N) totale.....	8%
Azoto (N) organico	0,3%
Azoto (N) nitrico	5,7%
Azoto (N) ureico	2%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	7,3%
Boro (B) solubile in acqua	0,3%
Carbonio (C) organico di origine biologica.....	3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

pH tal quale: **3,3**
Peso Specifico a 20°C: **1,24 kg/L**

PROVE SU FRAGOLA COLTURA Fragola var. Camarosa

ANNO
2010
LOCALITÀ
Coop. CORA a HUELVA (ES)
PRODOTTO
Radiflor
PERIODO TRATTAMENTO
A partire da gennaio
DOSE IMPIEGO
1,5 L/1000 m² a cadenza di 15 giorni



CARATTERISTICHE

RADIFLOR va impiegato con la finalità di migliorare la produzione commerciale, garantendo uniformità, pezzatura e forma del frutto in condizioni di bassa luminosità e freddo. RADIFLOR ha evidenziato un'importante effetto secondario su molte piante, dove si è riscontrato un apprezzabile accorciamento degli internodi con conseguente portamento più compatto ed armonico della coltura.

L'impiego di RADIFLOR ha ridotto sensibilmente il numero dei frutti deformi nei periodi di freddo più intenso.



Piante di fragole trattate con RADIFLOR.

AVVERTENZE

Per una migliore efficacia di RADIFLOR si suggerisce di applicarlo da solo.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Orticole

1-1,5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
2-3 applicazioni a partire da 10-15 giorni dopo il trapianto, distanziando gli interventi di 15 giorni.

Pomodoro, Carciofo

1-1,5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
Interventi puntuali con 15 kg/ha nei momenti in cui si vuole favorire l'emissione di nuovi fiori.

Fragola

1-1,5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
Dalla ripresa vegetativa ogni 10 giorni sino ad inizio fioritura.

Floricole

1-1,5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
2-3 interventi distanziati di 10-15 giorni nel mese precedente la fioritura.

Frutticole, Agrumi, Fragola

1-1,5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
Eseguire 2 applicazioni:
- 10 L/ha in fase ingrossamento gemme;
- 10 L/ha all'inizio della fase di apertura dei fiori.

In ogni caso RADIFLOR è consigliato in qualsiasi occasione in cui si desidera favorire la fioritura e l'allegagione. **Si applica esclusivamente per via radicale, mediante un qualsiasi sistema di fertirrigazione localizzata. Può anche essere usato su colture idroponiche.**

